

FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE AO MÍLDIO DA VIDEIRA EM 2021

| Substância ativa | Designação comercial | Observações | MPB | I. S. (dias) | Modo de ação |
|--|--|--|---------|--|---|
| ametotradina (pirimidilamina) | ENERVIN SC (BASF) | Não fazer mais de 3 aplicações por ciclo cultural; | Não | 35 | Superfície/Preventivo |
| ametotradina+metirame (pirimidilamina+ ditiocarbamato) | ENERVIN (BASF) | | | | Superfície/Penetrante/ Preventivo / curativo fase inicial/ anti- esporulante |
| ametotradina+dimetomorfe (pirimidilamina-morfolina) | ORVEGO (BASF) | | | | |
| amissulbrome (sulfonamida) | LEIMAY (NISSAN CHEMICAL) | Não fazer mais de 2 aplicações por ciclo cultural | | 28 | Penetrante /Preventivo |
| amissulbrome + folpete (sulfonamida+ftalimida) | SANVINO (ADAMA) | Não fazer mais de 3 aplicações por ciclo cultural | | 28 | Penetrante /superfície/Preventivo |
| amissulbrome + mancozebe (sulfonamida+ditiocarbamato) | MOONLIGHT (UPL) | Não fazer mais de 2 aplicações por ciclo cultural | | | |
| azoxistrobina (estrobilurina) | AZAKA (CHEMINOVA) | Não fazer mais de 3 aplicações por ciclo cultural; ação simultânea anti-oidio; | | 21 | Penetrante com mobilidade Translaminar e lateral/ atividade essencialmente Preventiva e anti-esporulante, algum ação curativa |
| | AZBANY PRO- (NUFARM PORTUGAL) | | | | |
| | QUADRIS (SYNGENTA) | | | | |
| | IRIBIS (FMC) | | | | |
| | SINSTAR (AGROLAC) | | | | |
| azoxistrobina + folpete (estrobilurina+N tiotrihalometilo) | QUADRIS MAX (SYNGENTA) v | Não aplicar em uvas de mesa ,com exceção de ** Não efetuar mais de 2 tratamentos por ciclo cultural | 28* | Superfície/ sistêmico/Preventivo/ curativo e anti-esporulante | |
| | TAGUS F (SELECTIS) | | | | |
| | TRUNFO F (SAPEC) | | | | |
| benalaxil-M + folpete (fenilamida + N tiotrihalometilo) | FANTIC F (ISAGRO_SPA) | | 42 | | 42* |
| | SAVIRAN STAR (ISAGRO_SPA) | | | | |
| | SIDECAR F (ISAGRO_SPA) | | | | |
| | STADIO F (ISAGRO_SPA) | | | | |
| benalaxil-M + mancozebe (fenilamida+ditiocarbamato) | FANTIC M (ISAGRO_SPA) | | 56*/42* | | * |
| | SAVIRAM MZ (ISAGRO) | | | | |
| | STADIO M (NUFARM PORUGAL) | | | | |
| | SIDECAR M (SPICAM PORUGAL) | | | | |
| bentiavalicarbe+cobre (amida+inorgânico) | SOLLICIT (UPL) | Em videiras de uva de mesa, aplicações apenas até à floração. Não efetuar mais de 3 aplicações por ciclo cultural) | 28 | Penetrante com mobilidade translaminar/superfície / Preventivo/ Curativo | |
| | VINTAGE DISPERSS (UPL IBERICA e GENIEN)) | | | | |
| ciazofamida (ciano-imidazol) | MILDICUT (ISK, BELCHIM)) | Não efetuar mais de 3 aplicações por ciclo cultural) | 21 | Penetrante com mobilidade translaminar/superfície / Preventivo | |
| | BRIONFLO 100 SC (EUROTSA) | | | | |
| | NANAMID 100 SC (MANICA) | | | | |
| | DARAMUN (DIACHEM) | | | | |
| | KENKIO (BELCHIM) | | | | |
| cioxanil+cobre (oxicloreto) (acetamida + inorgânico) | CIMOFARM C (SAPEC) | Aplicarem em pós-floração , não aplicar mais de 4 kg/há/ano de cu | 28 | Penetrante/superfície/ Preventivo e curativo | |
| | VITIPEC C (SAPEC) | | | | |
| | CIMONIL C (SELECTIS) | | | | |
| | CURAME 25 WG (MANICA | | | | |
| | VITIPEC C WG ADVANCE (SAPEC) | | | | |
| cioxanil+cobre (sulfato de cobre e cálcio) (acetamida + inorgânico) | INACOP PLUS BLU (IND. VALLES) | Não fazer mais de 3 aplicações em cada ano | 28 | Penetrante/Superfície/ Preventivo e curativo | |
| | CUPERTINE SUPER (IND. VALLES) | | | | |
| cioxanil+famoxadona (acetamida +oxazoladinadiona) | EQUATION PRO (DUPONT) | Realizar no máximo 1 tratamento. Em vinhas para produção de uvas de mesa, terá que ser posicionado antes da floração | 28* | 70* | |
| | MILGOLD PRO (DUPONT) | | | | |
| cioxanil+folpete (acetamida+azol +N-tiotrihalometilo) | TWINGO (SANGOSSE) | Realizar no máximo 3 tratamentos com este produto. Apenas em uvas para vinificação | 42 | Penetrante/Superfície/ Preventivo e curativo | |
| | MILITE (SELECTIS) | | | | |
| | MILITE AZUL (SELECTIS) | | | | |
| | VITIPEC AZUL (ASCENZA) | | | | |
| | VITIPEC (ASCENZA) | | | | |
| cioxanil+folpete+ fosetil-alumínio (acetamida+ftalimida +organometálico) | MAGMA TRIPLE WG (AFRASA) | Aplicar apenas com trator cabinado fechado | 28 | Penetrante/Sistêmico/ Preventivo e curativo | |
| cioxanil+folpete+ mancozebe (acetamida+N-tiotrihalometilo +ditiocarbamato) | MILTRIPLO (SELECTIS) | | 56* | Penetrante/Superfície Preventivo e curativo | |
| cioxanil+folpete+ metalaxil (acetamida+ftalimida+fenilamida) | EKYP TRIO (ASCENZA) | Não fazer mais de 2 aplicações em cada ano | 42*/28* | Penetrante /superfície/sistêmico/ Preventivo / curativo | |
| cioxanil+folpete+ metalaxil-M (acetamida+ ftalimida+fenilamida) | ACTLET EVO (ASCENZA) | Não fazer mais de 2 aplicações em cada ano, em uva de mesa apenas pode ser aplicado até á floração | 28* | | |
| | BOLTEX EVO (SELECTIS) | | | | |

FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE AO MÍLDIO DA VIDEIRA EM 2020 (CONTINUAÇÃO I)

| Substância ativa | Designação comercial | Observações | MPB | I. S. (dias) | Modo de ação | |
|--|-----------------------------------|--|-----|---|--|--------------|
| cimoxanil+folpete+ tebuconazol (acetamida + ftalimida + trazol) | VITIPEC COMBI AZUL (ASCENZA) | Ação simultânea anti-oidio | Não | 42 | Penetrante /superfície/sistêmico/ Preventivo / curativo | |
| cimoxanil+fosetil-alumínio+cobre (oxicloreto) (acetamida+fosfanato+inorgânico) | VITENE TRIPLO R (SPICAM PORTUGAL) | Para evitar resistências, não efetuar mais de 4 aplicações/ ciclo cultural | | 40 | Penetrante com ação translaminar/ sistêmico/Preventivo e curativo | |
| cimoxanil+ mancozebe (acetamida + ditiocarbamato) | CIMAZUL (SELECTIS) | | | 56*/28* * | Penetrante com ação translaminar/ Superfície/Preventivo e curativo | |
| | CIMOFARM M WG (INDOFIL) | | | Para evitar resistências, não efetuar mais de 2 aplicações/ ano com este produto. E 4 aplicações com outros produtos contendo cimoxanil | | 28 |
| | CIMORAME M WP (INDOFIL) | | | | | 56*/28* * |
| | MOXIMATE 505 WG (NUFARM) | | | | | 30* |
| | MOXIMATE 505 WP(INDOFIL) | | | | | 56*/28 |
| | MICENE AZUL (SIP. INAGRA) | | | | | 28 |
| | MICENE PLUS (SIP. INAGRA) | | | | | |
| | PROFILUX (BELCHIM) | | | | | |
| | VIRONEX MZ (IQV VALAGRO) | | 28 | | | |
| | CYMOZEB WG (BCP) | | | | | |
| EBRIMAX WG (BELCHIM) | | | | | | |
| cimoxanil+ metirame (acetamida + ditiocarbamato) | AVISOS DF (BASF) | Para evitar resistências , não efetuar mais de 3 aplicações por ciclo cultural | 35 | Penetrante com ação translaminar/ superfície/Preventivo e curativo | | |
| Cimoxanil +zoxamida (acetamida +benzamida) | MILRAZ PRO (SIPCAM) | 28 | | | | |
| cobre (oxicloreto) (inorgânico) (Aplicar apenas nos dois últimos tratamentos do ano) | NEORAM MICRO (ISAGRO_SPA) | No conjunto dos tratamentos com produtos contendo cobre, não exceder a dosagem de 4 Kg de Cu/ha/ano Aplicação nos últimos 2 tratamentos, favorece o atempamento das varas | SIM | 7 | Fungicida de superfície/ Preventivo | |
| | BLAURAME (IND_VALLÉS) | | | | | |
| | CUPRITAL (SAPEC) | | | | | |
| | CUPRAVIT (BAYER) | | | | | |
| | COBRE 50 SELECTIS (SELECTIS) | | | | | |
| | CURENOX 50 (IND_VALLÉS) | | | | | |
| | ULTRA COBRE (IND_VALLÉS) | | | | | |
| | EXTRA-COBRE 50 (IND_VALLÉS) | | | | | |
| | INACOP-L (INAGRA) | | | | | |
| | COBRE FLOW CAFFARO (ISAGRO_SPA) | | | | | |
| | FLOWRAM CAFFARO (ISAGRO_SPA) | | | | | |
| | HIDROTEC 50 WP (SELECTIS) | | | | | |
| | CUPROCAFFARO WG (ISAGRO) | | | | | |
| | CUPROCOL (SYNGENTA) | | | | | |
| | FLOWBRIX (MONTANWERKE) | | | | | |
| | FLOWBRIX BLU (MONTANWERKE) | | | | | |
| | CUPRITAL SC (AMBECEM) | | | | | |
| | COZI 50 (VALLÉS) | | | | | |
| | OXITEC 25% HI BIO (AMBECEM) | | | | | |
| | NUCOP M 35% HI BIO (AMBECEM) | | | | | |
| | CUPROXI FLO (ADAMA) | | | | | |
| | COPPER KEY FLOW(KEY) | | | | | |
| | COBRE LAINCO | | | | | |
| | CUPRA (LAINCO) | | | | | |
| | CODIMUR 50 (SARABIA) | | | | | |
| CODIMUR SC (SARABIA) | | | | | | |
| COPPER KEY (KEY) | | | | | | |
| CUPROZIM 35 (SPIESS) | | | | | | |
| OXICUPER (SELECTIS) | | | | | | |
| TRAXI 70 FLOW (BRANDT) | | | | | | |
| MARIMBA 35 WG (BELCHIM) | | | | | | |
| cobre (oxicloreto +sulfato de cobre)+benaxil-M (inorgânico fnilamida) | FANTIC A (ISAGRO) | Utilizar este produto após o aparecimento dos cachos | NÃO | 21*/40* * | Superfície/sistêmico/ Preventivo e curativo | |
| cobre (oxicloreto de cobre)+dimetomorfe (inorgânico+morfolina) | FORUM C (BASF) | Não fazer mais de 3 aplicações por ciclo cultural | | 21 | Superfície/penetrante/ Preventivo e anti-esporulante | |
| | SENADOR C (SELECTIS) | | | 28 | | |
| | SPYRIT C (SAPEC) | | | 28 | | |
| cobre(oxicloreto de cobre)+iprovalicarbe (inorgânico+carbamato) | MELODY COBRE (BAYER) | Usar só após a floração; Não fazer mais de 3 aplicações em cada ano | NÃO | 21 | Superfície/penetrante/ Preventivo e curativo anti-esporulante | |
| cobre(oxicloreto de cobre)+mandipropamida (inorgânico+mandelamida) | AMPECIO C (SYNGENTA) | Não fazer mais de 3 aplicações por ciclo cultural | | | | |

FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE AO MÍLDIO DA VIDEIRA EM 2020 (CONTINUAÇÃO II)

| Substância ativa | Designação comercial | Observações | MPB | I. S. (dias) | Modo de ação | | |
|--|----------------------------------|--|-----|--------------|---|----|--|
| cobre(oxicloreto de cobre)+ mancozebe (inorgânico+ditiocarbamato) | CODIMUR M (SARABIA) | | NÃO | 21 | Superfície/preventivo | | |
| | DOUBLE COPPER KEY | | | | | | |
| | LAINCOBRE M (LAINCO) | | | | | | |
| | AFROSAN DUPLO (AFRASA) | | | | | | |
| cobre (óxido cuproso) (inorgânico) | COBRE NORDOX 45 WG (MASSÓ) | Aplicar apenas nos dois últimos tratamentos. Não aplicar na floração, com tempo frio e chuvoso. | SIM | 21 | | | |
| | COBRE NORDOX 75 WG (MASSÓ) | | | | | | |
| cobre (hidróxido de cobre) (inorgânico) | KADOS (DUPONT) | Nunca aplicar durante a floração, se esta decorrer com tempo frio e chuvoso. Pode ter ação sobre geadas fracas, se aplicado antecipadamente. Não aplicar quando as condições são favoráveis à ocorrência de geadas fortes Não aplicar mais de 4 Kg de Cu/ha/ano | SIM | 7 | Superfície/ Preventivo | | |
| | KOCIDE 2000 (DUPONT) | | | | | | |
| | KOCIDE 35 DF (DUPONT) | | | | | | |
| | KOCIDE OPTI (DUPONT) | | | | | | |
| | CHAMPION WP (NUFARM_P) | | | | | | |
| | CHAMPION FLOW (NUFARM_P) | | | | | | |
| | COPERNICO 25% HIBIO (AMBECHEM) | | | | | | |
| | HIDROTEC 20% HIBIO (AMBECHEM) | | | | | | |
| | HIDROTEC 50% WP (SELECTIS) | | | | | | |
| | CHAMP DP (NUFARM_P) | | | | | | |
| | COPPER HYDROXIDE SELECTIS 20 | | | | | | |
| COBRE NORDOX 45 WG (CQ MASSÓ) | | | | | | | |
| MAXI COPPER WG (ASCENZA) | | | | | | | |
| cobre (hidróxido+ oxicloreto de cobre) (inorgânico) | CLARUS SC | Não aplicar mais de 4 Kg de Cu/ha/anos no conjunto dos produtos com cobre | SIM | 21 | | | |
| | CUPRANTOL DUO (ISAGRO) | | | | | | |
| cobre (hidróxido+ oxicloreto de cobre) + valifenalato (inorgânico+ valinamida carbamatos | VALIS PLUS (BELCHIM) | Não fazer mais de 2 aplicações por ciclo cultural | NÃO | 28 | Superfície/ Sistêmico translaminar e de difusão/Preventivo/ curativo/anti-esporulante | | |
| cobre (hidróxido)+dimetomorfe (inorgânico + morfolina) | SPHINX PLUS (ADAMA) | Não fazer mais de 3 a 4 aplicações por ciclo cultural | | | NÃO | 20 | Penetrante/Preventivo /curativo/anti-esporulante |
| | SPYRIT COPPER (ASCENZA) | | | | | | |
| SENADOR HC (SELECTIS) | | | | | | | |
| cobre (hidróxido)+metalaxil (inorgânico + fenilamida) | CYCLO R-líquido (EPAGRO) | Não fazer mais de 2 aplicações em cada ano | NÃO | 56 | Sistêmico/Preventivo e curativo e anti-esporulante | | |
| cobre (oxicloreto de cobre)+metalaxil-M | RIDOMIL GOLD R WG (SYNGENTA) | | | 20 | | | |
| cobre (sulfato de cobre tribásico) (inorgânico) | NOVICURE (UPL) | Realizar no máximo 5 aplicações no mesmo solo agrícola, com este produto não excedendo 4 Kg de cobre/ha/ano no conjunto dos produtos que contenham cobre | SIM | 21 | Superfície/ Preventivo | | |
| | CUPROXAT (NUFARM_P) | Não aplicar durante a floração com tempo frio e chuvoso | | 7 | | | |
| cobre (sulfato de cobre tribásico)+fosetil (sal alumínio) (inorgânico + organofosfonato) | OPTIX R (UPL) | Não aplicar durante a floração com tempo frio e chuvoso | NÃO | 28 | Superfície/Sistêmico/Preventivo | | |
| cobre (sulfato de cobre tribásico)+zoxamida (inorgânico + benzamida) | AMALINE FLOW (NUFARM_P) | Não fazer mais de 3 aplicações em cada ano. Não aplicar durante a floração | | 28 | Superfície e penetrante/ Preventivo | | |
| cobre (sulfato de cobre e cálcio) + mancozebe (inorgânico + ditiocarbamato) | CUPERTINE M (IND. VALLÉS) | Não aplicar durante a floração com tempo frio e chuvoso | | 56*/56* | Superfície/Preventivo | | |
| cobre (sulfato cobre e cálcio – mistura bordalesa) (inorgânico) | BORDEAUX MISTURE 124 SC | Não aplicar durante a floração com tempo frio e chuvoso | SIM | 21 | Superfície/ Preventivo | | |
| | MANIFLOW (MANICA)) | | | | | | |
| | CALDA BORDALESA QUIMIGAL (VALLÉS | | | | | | |
| | CALDA BORDALESA RSR (CEREXAGRI) | | | | | | |
| | CALDA BORDALESA QUIMAGRO | | | | | | |
| | CALDA BORDALESA SELECTIS | | | | | | |
| | BORDALESA SELECTIS 124 SC | | | | | | |
| | CALDA BORDALESA CAFFARO 20 | | | | | | |
| CALDA BORDALESA VÁLLES | | | | | | | |
| cobre (sulfato e cálcio – mistura bordalesa) (inorgânico) | CALDA BORDALESA SAPEC | Não fazer mais de 3 aplicações em cada ano | SIM | 7 | Superfície/ Preventivo | | |
| | MANIFLOW (MANICA) | | | 21 | | | |
| cobre (sulfato cobree cálcio mistura bordalesa)+cimoxanil (inorgânico+acetamida) | INACOP PLUS BLUE (VALLÉS | Não fazer mais de 4 aplicações em cada ano | NÃO | 21 | Superfície/penetrante/ preventivo e curativo | | |
| | CURAME POLTIGLIA | | | 20 | | | |

FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE AO MÍDIO DA VIDEIRA EM 2020 (CONTINUAÇÃO III)

| Substância ativa | Designação comercial | Observações | MPB | I. S. (dias) | Modo de ação | |
|---|--------------------------------|--|-----------------|---|---|-----------|
| Cos-oga (fosfanato) | (FYTOSAVE (FYTOFEND) | Não fazer mais de 8aplicações em cada ano | SIM | 3 | Preventivo/ativador das defesas naturais das plantas | |
| Ditianão +fosfanato de potássio (quinona + fosfanato) | ENVITA (BASF) | Não fazer mais de 4 aplicações/ ano, apenas em uvas para vinificação | NÃO | 42* | Superfície/Sistémico/ Preventivo/Estimula a defesa natural das plantas | |
| dimetomorfe (morfolina) | SPHINX (ADAMA) | Dependendo do produto, não efetuar mais de 3 a 4 aplicações/ano Alguns dos produtos contendo folpete não podem ser aplicados em uva de mesa, ou apenas até à floração*** (consultar rótulo) | | 10 | Penetrante/Preventivo/ anti-esporulante | |
| dimetomorfe+ditianão (morfolina+quinona) | FORUM GOLD (BASF) | | | 35 | | |
| dimetomorfe + folpete (morfolina+N-tiotrihalometilo) | DIFOMIL WG (SHARDA) | | | 40* | | |
| | FORUM F (BASF) | | | 42* | | |
| | BACO WG (NUFARM PORTUGAL) | | | 40* | | |
| | METOMOR F (SHARDA COPROCHEM) | | | 40* | | |
| | SENADOR F (SELECTIS) | | | 42* | | |
| | SPYRIT F(ASCENZA) | | | 42*/*** | | |
| | VINOSTAR (ADAMA) | | | 42* | | |
| dimetomorfe + mancozebe (morfolina+ditiocarbamato) | FILDER 69 WG (UPL IBERIA) | | | | | 28 |
| | ACROBAT M DG (BASF) | | | | | |
| | CYNDA (ARYSTA) | | | | | |
| | PARAAT (BASF) | | | | | |
| | SENADOR MZ (SELECTIS) | | | | | |
| dimetomorfe+metirame morfolina+alquilenobis(ditiocarbamato) | SLOGAN TOP (BASF) | | | 66*/28* * | | |
| | | | 35 | | | |
| dimetomorfe +piraclostrobina (morfolina +estrobilurina) | CABRIO TEAM (BASF) | Não fazer mais de 3 aplicações no conjunto das doenças a tratar / ano. Combate simultaneamente o oídio, apenas para uva de mesa | | 35** | Penetrante com mobilidade translaminar/Preventivo/ Curativo/ anti-esporulante | |
| dimetomorfe+zoxamida (morfolina + benzamida) | PRESIDIUM (GOWANL) | Não fazer mais de 3 aplicações em cada ano | | | Penetrante/Preventivo / anti-esporulante | |
| fluopicolida+ foseetil-alumínio (benzamida + organometálico) | PROFILER (BAYER) | Não fazer mais de 2 aplicações em cada ano | | 28 | Penetrante c/movimento translaminar/ Sistémico/Preventivo com ligeira ação curativa e anti-esporulante | |
| folpete (ftalimida) | FLEXI 80 WG (SHARDA) | Alguns fungicidas com a s. ativa folpete não devem ser utilizados em vinhas para produção de uvas de mesa; ou apenas podem ser utilizados até à floração*** (Consultar rótulo do produto) | 28* | Superfície/Preventivo | | |
| | FOLLOW 80 (SHARDA/NUFARMA) | | 28* | | | |
| | FOLPETIS SC (SELECTIS) | | 28* | | | |
| | FOLPAN 80 WDG (ADAMA) | | 42 | | | |
| | FOL-HITEC(SHARDA) | | 28* | | | |
| | FOLPEC 50 (SAPEC) | | 42* | | | |
| | FOLPEC 50 SC (ASCENZA) | | 28* | | | |
| | FOLPEC 50 AZUL (SAPEC) | | 34* | | | |
| | FOLLET 80 WG (SHARDA) | | 28* | | | |
| | FLOVINE (ADAMA) | | 42*/56** | | | |
| | SOLOFOL (BELCHIM) | | 28*/*** | | | |
| folpete+fosetil (sal alumínio) (ftalimida + organofosfonato) | RHODAX FLASH (BAYER) | | 42* | Superfície/Sistémico/ Preventivo/ Ligeira ação curativa | | |
| | MAESTRO F (SAPEC) | | | | | |
| | MAESTRO F AZUL (HELM AG) | | | | | |
| | MAESTRO F WG ADVANCE (ASCENZA) | | | | | |
| | ZETYL COMBI AZUL (HELM AG) | | | | | |
| | ZETIL COMBI (SELECTIS) | | | | | |
| folpete+fosetil-alumínio+ iprovalicarbe (ftalimida+organometálico+amida) | MELODY SUPER (BAYER) | Alguns fungicidas que contenham folpete não devem ser utilizados em | | 42* | Superfície/Sistémico/ Preventivo/ Curativo e antiesporulante | |

FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE AO MÍLDIO DA Videira em 2020 (CONTINUAÇÃO IV)

| Substância ativa | Designação comercial | Observações | MPB | I. S. (dias) | Modo de ação |
|--|---|---|-----|---|--|
| folpete+ iprovalicarbe (ftalimida+carbamato) | MELODY (BAYER) | vinhas para produção de uvas de mesa; ou apenas podem ser utilizados até à floração não fazer mais de 3 aplicações por ciclo cultural (Consultar rótulo do produto) | NÃO | | Superfície/sistémico/p reventivo e curativo e anti-esporulante |
| Folpete+ mancozebe +cimoxanil (ftalimida +ditiocarbamato+acetamida) | MILTRIPLO (SELECTIS) | | | 56* | Superfície/penetrante/ prevenivo/curativo |
| folpete+mandipropamida (ftalimida + mandelamida) | MANDATÓRIO F (SYNGENTA) PERGADO F (SYNGENTA) | | | 28* 28* | Superfície/penetrante /prevenivo/ Curativo e anti-esporulante |
| folpete+metalaxil (ftalimida + fenilamida) | EKYP COMBI (ASCENZA) | Alguns fungicidas que contenham folpete em produção de uvas de mesa; apenas podem ser aplicados até à floração Não fazer mais de 2 aplicações por ciclo cultural | | 42*/28* | Sistémico/ Preventivo/ Curativo |
| | EKYP COMBI AZUL (ASCENZA) | | | 28*/56* | |
| | ARMETIL 50 (VALLÉS) | | | 28*/42* | |
| | MEVAXIL COMBI (VALLÉS) | | | | |
| folpete+metalaxil-M (ftalimida + fenilamida) | FOLPAXIL AZUL (SELECTIS) | Em uva de mesa, aplicações apenas até à floração**, não efetuar mais de 2 aplicações por ciclo cultural. Não fazer mais de 2 aplicações por ciclo cultural. Alguns fungicidas que contenham folpete não podem ser aplicados em vinhas para produção de uvas de mesa , ou apenas até à floração(Ver rótulo) | | 28*/** | Superfície /Sistémico/ Preventivo/ Curativo |
| | CYCLO M PLUS (AFRASA) | | | 28 | |
| | BOLTEX F (SELECTIS) | | | 28 | |
| | ACTLET F (ASCENZA) | | 42* | | |
| | MILDOR COMBI F (AGCHEML) | | | | |
| | FANTATIC F (ISAGRO) | | | | |
| | FOLPAN GOLD (ADAMA) | | | | |
| SAVIRAN STAR (ISAGRO) | | | | | |
| RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE (SYNGENTA) | | | | | |
| folpete+ oxatiapiprolina (ftalimida + piperidinil-tiazol-oxatia) | ZORVEC™ VINABRIA™ (DUPONT) | Não fazer mais de 2 aplicações | 56 | Superfície/movimento sistémico, translaminar e ascendente via xilema / Preventivo/ Curativo | |
| folpete+ piraclostrobina (ftalimida + estrobilurina) | CABRIO STAR (BASF) | Não fazer mais de 2 aplicações consecutivas e 3 aplicações no total | 42* | Superfície/Penetrante translaminar/Prevenitivo/ curativo | |
| folpete+valifenalato (ftalimida + amidas ac) | VALIS F (BELCHIM) | Não fazer mais de 3 aplicações, apenas em uvas para vinificação | 42* | Superfície/Sistémico com sistemática ascendente /Prevenitivo/ curativo | |
| | JAVA F (BELCHIM) | | | | |
| | EMENDO F (BELCHIM) | | | | |
| fosetil (sal de alumínio) (organometálico) | FOSAL 80 WG (CHEMINOVA) | Não fazer mais de 2 a 4 aplicações por ciclo cultural dependendo do produto, consultar rótulo | 28 | Sistémico (ativa defesas naturais das plantas)/Prevenitivo | |
| | KITAN DUPLO (GENYENM) | | | | |
| | KEYFOL WG (KEY) | | | | |
| | KEYFOL WP (KEY) | | | | |
| | KILATE WG (LAINKO) | | | | |
| | KILATE (LAINKO) | | | | |
| | GOLBEX WG (SARABIA) | | | | |
| | GOLBEX WP (SARABIA) | | | | |
| | FOSPROBEL 80 WG (PROBELTE) | | | | 28* |
| | ALIAL 80 WG (FMC) | 28 | | | |
| GOLBEX WG (SARABIA) | | | | | |
| OPTIX DISPERS (UPL) | Não fazer mais de 6 aplicações por ano. | | | | |
| fosetil-alumínio+ mancozebe (organofosfonado+ditiocarbamat) | MAESTRO M WG ADVANCE (SAPEC) | Não fazer mais de 2 a 3 aplicações por ano (consultar o rótulo) | 28 | Sistémico (ativa defesas naturais das plantas)/ Superfície /Prevenitivo | |
| | ZETYL MZ WG (SELECTIS) | | | | |
| | MILAGRO (SPICAM) | | | | |
| | KATANGA DUPLO (GENYEN) | | | | |
| | FILAL DUPLO (AFRASA) | | | | |
| | KITAN DUPLO (GENYEN) | | | | |
| | ALFIL DUPLO (AFRASA) | | | | |
| fosfanatos de dissódio (fosfanato) | CERAXEL (BELCHIM) | | 21 | | |
| fosfanatos de potássio (fosfanato) | ALEXIN 75 LS (LUX) | Não efetuar mais de 3 a 5 aplicações /ciclo cultural (Dependendo do produto usado, consultar rótulo). Dose máxima /ha é de 4L | 15 | Sistémico/ prevenitivo/Estimula a defesa natural das plantas | |
| | PHYTO SARCAN (EXSA) | | | | |
| | SAVIAL FORTE (LAINKO) | | | | |
| | CURANE EVO (SIPCAM) | | | | |
| | FOSKIA (BIOVERT) | | | | |
| | SORIALE (LUX) | | | | |

FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE AO MÍLDIO DA VIDEIRA EM 2020 (CONTINUAÇÃO V)

| Substância ativa | Designação comercial | Observações | MPB | I. S. (dias) | Modo de ação |
|--|--------------------------------|---|-----|--------------|---|
| Fluopicolida (benzamida) foseetil (sal de alumínio) (organometálico) | PROFILER (BAYER) | Não fazer mais de 2 aplicações por ciclo cultural | | 28 | Penetrante translaminar /sistémico / estimula as defesas naturais das plantas. Preventivo, curativo e anti-esporulante. |
| Fluaziname (dinitroanilina) | TIZCA (FMC) | Aplicar o produto sempre em mistura com fungicidas anti-míldio sistémicos ou penetrantes. Não efetuar mais de uma aplicação por ciclo cultural para o conjunto das doenças a tratar. | | 28* | Superfície /Preventivo |
| mancozebe (ditiocarbamato) | DITHANE NEOTEC (LUSOSEM) | Não fazer mais de 4 aplicações por ciclo cultural, com estes ou outros produtos contendo ditiocarbamatos (De acordo com o ofício/ circular nº 25/2020 da DGAV, os produtos que contenham a substancia ativa mancozebe, ou mistura de mancozebe com outras substancias ativas, apenas poderão ser utilizados na presente campanha) | 8 | 28 | Superfície / Preventivo |
| | MANFIL 75 WG (INDOFIL) | | | | |
| | MANZENE WG (AGROTOTAL) | | | | |
| | STEP 75 WG (SAPEC) | | | | |
| | STEP WG (ASCENZA) | | | | |
| | MANCOZAN (BAYER) | | | | |
| | MANCOZEBE SAPEC (SAPEC) | | | | |
| | MANCOZEBE SELECTIS (SELECTIS) | | | | |
| | MANCOZEBE ASCENZA (ASCENZA) | | | | |
| | MANZENE WG (AGCHEM) | | | | |
| | MILTANE MICRO WG (SELECTIS) | | | | |
| | MILTANE MICRO (SELECTIS) | | | | |
| | FUNGITANE WP (SIPCAM_P) | | | | |
| | MANZATE (UPL) | | | | |
| | MANZATE WG (UPL) | | | | |
| | VONDOZEB GD (UPL IBERIA) | | | | |
| | FUNGITANE AZUL WP (SIPCAM_P) | | | | |
| | FUNGITAN WP (SIPCAM) | | | | |
| | DITHANE M-45 (ILUSOSEML) | | | | |
| | VONDOZEB-D 80 PM (UPL IBERIAS) | | | | |
| | CAIMAN WP (EPAGRO) | | | | |
| | MANFIL 80 WP (INDOFIL) | | | | |
| | MANFIL 75 WG (INDOFIL) | | | | |
| UNIZEB (GENYENI) | | | | | |
| MANCOZEBE 80 VALLÉS | | | | | |
| MANGAZEB (LAINCO) | | | | | |
| MAESTRO M (SAPEC) | | | | | |
| SABERO MANCOZEBE 80 (SABERO) | | | | | |
| AVTAR 75 NT (INDOFIL) | | | | | |
| TRIMANOC DG (UPL) | | | | | |
| mancozebe + fosestill (ditiocarbamato + fosfanatoa) | AFIL DUPLO WG (AFRASA) | Não fazer mais de 3 aplicações em cada ano | | 28 | Superfície/sistémico/ Preventivo |
| mancozebe + metalaxil (ditiocarbamato + fenilamida) | CRUZADO MZ (SELLECTIS) | Não fazer mais de 2 aplicações por ciclo cultural. Combate simultaneamente Black Rot | | 56*/28* | Superfície/Sistémico /Preventivo / Curativo |
| | ARMETIL M (IQV AGRO PT) | | | | |
| | SABRE M (JOVAGRO)S) | | | | |
| mancozebe + metalaxil-M (ditiocarbamato + fenilamida) | RIKOR MZ (SYNGENTA) | | | | |
| | MILDOR GOLD MZ (AGROTOTAL) | | | | |
| mancozebe+ zoxamida +metenamida (ditiocarbamato+ benzamida) | LIETO (SIPCAM) | Não fazer mais de 3 aplicações por ciclo cultural | | 28 | Superfície/Penetrante/ Preventivo |
| | ADERIO (GOWAN) | | | | |
| mandipropamida+ zoxamida (mandelamida+benzamida) | AMPEXIO (SYNGENTA) | | | 21 | Penetrante translaminar/Preventivo/ Curativo / anti-esporulante |
| metirame (ditiocarbamato) | POLYRAM DF (BASF) | Não fazer mais de 3 aplicações por ciclo cultural | | 28 | Superf./Preventivo |
| metirame+ piraclostrobina (ditiocarbamato+ metoxi-carbamato) | CABRIO TOP (BASF) | Não fazer mais de 3 aplicações por ciclo cultural Ação simultânea anti-oidio, Escoriose e Black rot | | 56 | Superf./Translaminar/ Preventivo/ Curativo |
| Oxatiapiprolina (piperidinyl-thiazole-isoxazoline) | ORONDIS (DUPONT) | Não fazer mais de 2 aplicações em cada ano | | 14 | Movimento sistémico Translaminar e ascendente via xilema / Preventivo/ Curativo |
| | ZORVEC TM ZELAVIM TM (DUPONT) | | | | |

FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE AO MÍLDIO DA VIDEIRA EM 2020 (CONCLUSÃO)

| Substância ativa | Designação comercial | Observações | MPB | I. S. (dias) | Modo de ação | |
|---|---------------------------|---|-----|--------------|---|--|
| Oxatiaprolina +zoxamida (piperidiny-thiazole- isoxazoline +benzamida) | ZORVEC™ VINABLE™ (DUPONT) | Não fazer mais de 2 aplicações em cada ano | NÃO | 28 | Movimento sistémico Translaminar e ascendente via xilema /Penetrante/ Preventivo/ Curativo | |
| piraclostrobina (estrobilurina) | CABRIO (BASF) | Não fazer mais de 3 aplicações por ciclo cultural | | 35 | Penetrante Translaminar/ Preventivo /Curativo | |
| óleo de laranja | PREV-AM (OROAGRI) | Não fazer mais de 6 aplicações por ciclo cultural Previne simultaneamente o Oídio | SIM | 1 | Preventivo/Contato | |
| | LIMOCIDE J (VIVAGRO) | | | | | |
| cerevisana | ROMEO (AGRO-LEVURES) | Realizar no máximo 10 tratamentos por ano. Trata simultaneamente o oídio e a podridão cinzenta | | | | Indutor da resistência das plantas. . Preventivo |
| | ACTILEAF | | | | | |
| zoxamida (benzamida) | ZOXIUM 240 SC () | Não fazer mais de 5 aplicações por ciclo cultural, até 3 consecutivos | | NÃO | 28 | Penetrante/ Preventivo |

Estação de Avisos de Entre Douro e Minho

Fonte: SIFITO.DGAV.PT (consultada em 11/01/2021)

NOTAS: MPB. – Modo de Produção Biológico; I.S. – Intervalo de segurança (Uva vinificação*/Uva de mesa**, Aplicado apenas até á floração em Uvas de mesa***

A informação apresentada não dispensa a consulta do Rótulo e/ou Ficha Técnica dos produtos.